

醫心方卷第十二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治消渴方第一

治湯利方第二

醫心方卷第十二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治消渴方第一

治湯利方第二

治內消方第三

治諸淋方第四

治石淋方第五

治氣淋方第六

治勞淋方第七

治膏淋方第八

治血淋方第九

治熱淋方第十

治寒淋方第十一

治大少便不通方第十二

治大便不通方第十三

治大便難方第十四

治大便失禁方第十五

治大便下血方第十六

治小便不通方第十七

治小便難方第十八

治小便數方第十九

治小便不禁方第二十

治小便黃赤方第二十一

治小便血方第二十二

治遺尿方第二十三

治尿淋方第二十四

治消渴方第一

病源論云消者渴渴而不小便是也由少服五石

諸丸散積經年歲石熱結於腎中使人下焦虛熱

及至年衰血氣減少不復制於石熱獨盛則腎

為之燥腎燥故引水而不小便也其病變多癰

疽此坐熱氣留於經絡不利血氣癰滿故

病源論云消者渴渴而不小便是也由少服五石
諸九散積經年歲石熱結於腎中使人下焦虛熱
及至年衰血氣減少不復制於石熱獨盛則腎
為之燔腎燔故引水而不小便也其病變多癰
疽此坐熱氣而於經絡不利血氣癰滿故
成癰膿

千金方云論曰凡積久與消未有不成消渴然則
大寒凝海而消不凍明其消性酷熱物無以加脯
及石塩鹹無以喻此之味消客耽者不離其口三
觴之後制不由已飲敢無度咀嚼酢腎不釋酸
鹹積年長夜酣興不懸遂使三焦猛熱五歲于
燥木石猶且焦枯在人何能不渴

小品方云說曰少時服五石諸九散者積經年歲
久轉虛耗石熱結於腎中使人下焦虛熱小便
數利則作消利之病不渴而小便自利也
作消渴之疾但渴不利也又作渴利之
病隨飲小便也又作強中病之者並長興終不
痿溺液自出之作瘻疽之病凡如此等宜服猪
腎薤蕒湯制其腎中石熱將飼鴨通凡便差也
其方在本書

又云鉉丹散治消渴小便便方
鉉丹二分 枯樓十分 澤馬五分 石膏五分
赤石脂五分 白石脂五分 胡椒二分 甘草十分

痼疾論云
強中病者
是由少脈
五石之藥
主胃中
下焦虛

痿溺液自出左作瘻疽之病右凡如此等宜服猪
腎一薈茺湯腎經制其腎中石熱一時飢鴨通二凡便差也十五又

其方在本書

又玄鉉丹散治消渴止小便方

鉉丹二分
 枯樓十分

澤馬五久

石膏五分

赤石脂五分
白石脂五分

胡椒二分

甘草十八

凡八物治下獲瀉方

附
卷
目
三
下

知个工稍增世三

服^草之^レ得病一年^{ナラ}服

樂一日愈

年二日著

者夜以水服勿用酒

又云伯曰飲一石許小便不通枳樓丸方

栝樓三分
鉉丹三分

葛根三升

附子一名牙子一分

凡四物治下莖丸如梧子飲服十九日三

又治消渴方

取活螺三斗以江水一石養之傾取冷汁配飲之

經曰放去更取新者漬之

又云灸消渴法

卷開元一處又使兩處各二寸二處各及廿寸

日一報至百五十壯

今茶明堂之圃元在簷下三寸
千金方發冒管穴

千金方治消渴方

飲豉汁任性多少

又方濃煮竹根汁飲之

又方 蒼青 梁米汁 飲之

又云栝樓散治大渴秘方

深堀大枯樓厚削皮至白ナ霞ナ心寸切之ヒタセ水浸一日一

千金方治消渴方

飲豉汁任性多少

又方濃煮竹根汁飲之

又方煮青梁米汁飲之

又云栝樓根治大渴秘方

深掘大栝樓厚削皮至白裏心寸切之水浸一日一

易水經五日出取鴛以絹帟碎之如米粉法水服

方寸匕日三四点可作粥乳酪中食之不限多

少取老

葛氏方治卒消渴小便多方

多作竹瀝飲恣口數日愈

又方破故屋凡煮之多飲汁

又方石膏半斤鴛碎以水一斗煮取五升稍服

又方栝樓根薄切炙五兩水五升煮取四升飲之

錄驗方治消渴日飲六七斗小麦湯方

小麦一升栝樓根切一升 麥門冬一升

右三物以水三斗煮取一斗半飲之

新錄方治消渴方

鴛生葛汁飲之

龍門方療消渴方

生胡麻油一升頓服之立驗

又方爛煮葵汁置冷露中每渴即飲之

僧深方治消渴唇干口燥芍杞湯方

又方
鴈生葛汁飲之

龍門方療消渴方

生胡麻油一升頓服之三驗

又方爛煮葵汁置冷露中每渴即飲之

僧深方治消渴唇干口燥芎朮湯方

芎朮根五升

剉皮

石膏一升

小麦三升一名細石 一方小豆

凡三物切以水加上洗淨合煮麥熟湯成去滓適

寒溫飲之

握要方療渴身體發腫方

第根三升千二 槌破以水二斗煮取二升一日服盡可

服一副

經心方黍米湯治渴神方

干黍米一升以水三升煮取一升去滓服一升日再

服良

耆婆方治人渴方

栝樓十兩

白梁米五小升

右以水一斗二升煮取三升去滓久三服

范汪方治消渴湯方

麥門冬一兩

玄依根二兩

竹葉一杞

凡三物文咀水七升煮取令得三升半久再服神有

驗

陶景本草注治消渴方

黃芩草汁及生十根之方鳥冬根更良

范汪方治消渴湯方

麥門冬一兩 ヒサシク 玄依根二兩 竹葉一杞

凡三物文咀水七升煮取令得三升半久再服神有驗

陶景本草注治消渴方

煮葦草汁及生汁服之又方搗冬依紋服汁

蘇敬本草注治消渴方

食大麥麵良 又單食來堪良

又方粟米粳米汁飲之立差

孟詵食經消渴方

麻子一升搗水三升煮三四沸去滓冷服半升日三

五日即愈

今案渴家可食物

蘇蜜煎 治消渴 補血

石膏 一名細石 本草云主消渴

青梁米 本草云主渴利 和名安波乃米

粟米 本草云主消渴 和名云何波乃字而之稱

猕猴桃 崔禹玄主消渴 和名已久波

菰根 七卷食經云除消渴 和名已久乃稱

冬菰 本草云主消渴 和名加毛字利

松菜 本草云解消渴 和名太加奈

紫萁 七卷食經云消渴 和名波久倍良

骨蓬 本草云主消渴

寒水石 一名白石 本草云主消渴

大麥 本草云主消渴 和名不止半支

小麥 本草云止燥渴 和名古半支

赤小豆 本草云消渴 和名云何加何都支

馬芋 本草云主消渴 和名久和為

竹筴 本草云主消渴 和名多加半奈

葵菜 崔禹玄消渴 和名阿不此

蘆花 本草云主消渴大有驗 和名於保稱

蓴 本草云主消渴 和名奴奈波

石莖 崔禹玄治消渴

猕猴桃 崔禹云主消渴 和名已久波

馬辛 本草云主消渴 和名久和為

菰根 七卷食經云除消渴 和名已久乃稱

竹筴 本草云主消渴 和名多如羊奈

冬花 本草云主消渴 和名加毛字利

葵菜 崔禹云主消渴 和名阿不此

菰菜 和名太加奈

蘆荻 本草云主消渴大有驗 和名於保祿

紫萸 七卷食經云消渴 和名波久倍良

尊 本草云主消渴 和名双奈波

骨蓬 本草云主消渴 和名加波保祿

石莖 崔禹云主消渴 和名右毛

紫苔 崔禹云主消渴 和名須羊乃利

牛乳 本草云止渴 和名字之乃知

酪 本草云止渴

鹿頭 崔禹云主消渴 和名久良介

鯉魚 本草云止渴 和名已此

海月 和名久良介

鱧 本草云止渴 和名加支

石陽子 崔禹云主消渴利 和名加支

龍蹄子 崔禹云消渴利 和名在

寄居 崔禹云主渴 和名加手奈

河貝子 崔禹云主消渴 和名三奈

田中龜子 本草云止渴 和名多都此

渴家可忌物 物

千金方云所慎者有三一則酒二則房室三則

鹹食及麵

養生要集云小麦合菰米食復飲酒令人消渴

小品方云忌食猪肉

治渴利方第二

病源論云渴利者隨飲隨少便是也由少時眼乳石

勢盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱

則腎燥則渴然腎腎虛又不能傳制水

液故隨飲隨小便也

葛氏方治大渴利日飲數斛小便亦尔者方

-2 138 38 745" data-label="Text">

治渴利方第二

病源論云渴利者隨飲隨少便是也由少時服乳石
、勢盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱
、則腎燥、則渴然腎虛又不能傳制水

液故隨飲隨小便也

葛氏方治大渴利日飲數斛小便亦尔者方

栝樓 黃連 防己 鉅丹 分等鴉米以苦酒一合

水一合和作漿服方寸匕日三

范汪方治渴日飲一斛小便如之栝樓湯方

栝樓二兩 黃連一升 甘草二兩

凡三物水五升煮取二升半分三服

集驗方治渴日飲一斛者方

入地三尺取桑根白皮及令黃黑細切以水令

相淹煮之以味濃為度熱飲之勿与塩与米

非嫌大驗

治内消方第三

病源論云内消病者不渴而小便多是也由少服石

熱結於腎内熱之所作也

小品方云夫内消之為病皆熱中所作也小便多於

所飲令人虛極短氣内消者食物皆消作小便去

而不渴也治之宜起湯

芎藭枝葉一斤 各組三兩 栝樓根三兩

石膏三兩 一方 黃連三兩 甘草二兩

契結於腎內熱之所作也

小品方云夫內消之為病皆契中所作也小便多於所飲令人虛極短氣內消者食物皆消作小便去而不渴也治之^龍芎藭湯

芎藭枝葉一斤 冬根三兩 栝樓根三兩

石膏三兩^{一名細石} 黃連三兩^{一方} 甘草二兩

凡五物切以水一斗煮取三升一服五合日三

又古治小便多晝夜數十起方

小豆生藿一把凡一物擣絞平取汁頻飲三升便

愈^龍治小兒利

令李方治小便利多秦膠散方

秦膠一分 陳芥子二分

凡二物治下篩酒服方寸匕日三

治諸淋方第四

病源論云諸淋者由腎虛而膀胱熱故也其狀小

便出少起數小腹絃急痛引於膻

葛氏方治卒患淋方

冬足大指前節上十壯良

又方灸兩足外踝中央近年壯有石即下

又方但服葶草汁一升不過三升治石淋

又方豉一升水三升漬少時以塩一合內中頻服

經心方豉半升水四升煮一沸頻服豆通不加塩

樣要云療淋方

冬足大指前筋上十此良

又方灸兩足外踝中央追年此有石即下

又方但服葎草汁一升不過三升治石淋

又方豉一升水三升漬少時以塩一合內中頻服

經心方豉半升水四升煮
一沸頻服立通不加塩

極要云療淋方

石煮石醵汁飲之良驗以水煮之

范汪方治淋滑石散方

葵子一升 滑石一兩 通草二兩

凡三物治後酒服方寸匕日三

又云治淋枯樓散方

石聿二分 通草一分 枯樓二分

葵子四分

凡四物治後先食以麥粥服方寸匕日三無不愈

不又方常以冬葵根作飲良

小品方治淋病不得小便陰上絞痛方

灸足大衝五十壯 在足大指本
前後二寸

又方灸懸泉一名中封十四壯 中封在足
內踝前寸

廣利方理諸淋小便卒不通方

麻根二十七枚 切

右以水二大升煎取八九合去滓分溫三服

集驗方卒得淋方

取牛耳中毛燒服半錢上立愈

又方灸懸泉一名中封十四壯
廣利方理諸淋小便卒不通方

內踝前寸

麻根二十七枚切

右以水二大升煎取八九合去滓分溫三服

集驗方卒得淋方

取牛耳中毛燒服半錢上立愈

又方以比輪錢三百文以水一斗煮得三升飲之

千金秘不傳

錄驗方治淋瞿麥散方

瞿麥四兩 石棗四兩 滑石四兩碎

車前子四兩 葵子四兩

凡五物搗篩冷水服方寸匕日三增至五匕慎

酒麴

新錄方治淋方

馬莧莖菜鴉汁一升二三服

治石淋方第五

病源論云石淋者淋而出石也腎主水結則化為

石故腎客沙石腎虛為勢所垂熱則成淋其狀

小便莖裏痛尿不能卒出痛引少腹膀胱裏急

沙石從小便道出甚者塞痛令悶絕

小品方治石淋神方

車前子二升以絹囊盛以水八升煮取三升盡

服之日移一大石子當出宿不食飲之良

石故醫容沙石腎虛為勢所垂熱見以冰其

小便莖裏痛尿不能卒出痛引少腹膀胱裏急

沙石從小便道出甚者塞痛令悶絕

小品方治石淋神方

車前子二升以絹囊盛以水八升煮取三升盡

服之日移一大石子當出宿不食飲之良

又方生葎生葎莖葉合搗取汁服一升日三

又病石淋者下廿六種病不得小便方

灰用元卅粒千金方又方炙大敦卅粒在足大指端去

又方炙氣門卅粒似甲如蓮葉

錄驗方石淋方

取車前草煮多飲汁

又方石聾三升一八七滑石三升

凡二物下後合以米汁若蜜服刀圭上日三已效

効

葛氏方石淋者方

取驚矢末以冷水服錢五上清旦服至食時

當溺石

又方取故甑殼燒三拍撮服即通

又方石首魚頭中石一升貝齒一升合搗細篩

以苦酒和之為三升宿不食明且服一分白

中服一升暮服一升明日旦石悉下

鯀音念
和智伊之毛知

石江南人呼曰

石首魚者是也

今案食經
云鯀頭中有

當流石

又方取故甑燒三拍撮服即通

又方石首魚頭中石一升貝齒一升合搗細篩

以苦酒和分爲三服宿不食明且服一分白

中服一升暮服一升明日且石志下

石首魚者是也

千金方石淋方

浮石取滿手下篩水三升酢一升煮取二升澄

澄清服一升三服石出

本草拾遺云有以病爲藥者淋石主石淋水磨服

之當碎石隨溺出也人患石淋或於溺中出正如

小石非他物也

新錄方治石淋方

生葛根汁服五六合

又方葱白三升水六升煮取二升五合三服

陶景本草注煮麻根飲之

藥敬本草注楊烏芋根汁一升服之

崔禹食經煮葵子服之汁

治氣淋方第六

病源論云氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所爲也其狀

膀胱少腹皆滿尿澀常有餘瀝是也

千金方療氣淋方

必開元五十帖又及夾玉泉相去一寸半卅帖

治氣淋方第六

病源論云氣淋者腎虛膀胱熱氣脹而為也其狀
膀胱少腹皆滿尿澀常有餘瀝是也

千金方療氣淋方

各開元五十帖又炙去土泉相去一寸半卅帖

又方水三升煮取八合底苦如鴨甲大取二升一服

又方鴉葵子末湯服方寸匕

廣利方理氣淋暗下切痛方

以塩和少醋填臍中塩上炙二七帖五老

治勞淋方第七

病源論云勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎
氣通於陰其狀尿留莖內數起不出引少腹痛小
便不利勞倦即發

千金方療百淋寒淋熱淋勞淋小便澀肥中滿腹

急痛方

栝樓三兩

滑石二兩

石棗二兩

三味大麥粥飲服方寸匕日三

治膏淋方第八

病源論云膏淋者淋而其肥狀似膏故謂之膏淋

魚日肉淋此腎虛不能制其肥液相與小便俱出也

千金方云膏淋之為尿似膏自出療之一如氣淋

也 鴉葵草汁二升酢二合和空腹服之

治膏淋方第八

病源論云膏淋者淋而其肥狀似膏故謂之膏淋

也日肉淋此腎虛不能制其肥液相與小便俱出也

千金方云膏淋之為尿似膏自出療之一如氣淋

也 鳩尾草汁二升酢二合和空腹服之

治血淋方第九

病源論云血淋者是熱之甚者則尿血謂之血淋心

主血之行身通遍經絡脩環府藏勞熱甚者則散

失其常經溢添入胞而成血淋之

廣濟方治血淋方

車前葉鴉取汁半升和蜜一匙攪合銷頓

服之立差 廣利方

龍門方治血淋方

取刺薊根勿見風火一握淨洗鴉取汁半升

外服之極者不過三良

千金方療血淋方

石葷 當歸 蒲黃 夕藥 四味丸

等酒服一錢上日二

又方水五升煮麻根十枚取二升頓服

又方水四升煮大豆葉一把取二升頓服

又方炙丹田隨年壯在脊下二寸今案明堂

云石門一名丹田

等酒脹一錢上日二

又方水五升煮麻根十枚取二升頓服

又方水四升者大豆葉一把取二升頓服

又方灸丹田隨年壯在脊下二寸今案明堂

云石門一名丹田

治熱淋方第十

病源論云熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於肥

而成淋也其狀小便赤澀亦有宿為淋今得熱而發

者其熱則變尿血亦有小便後如豆羹汁狀者畜

作有時

葛氏方熱淋方

取白茅根四升剉之子問又破也折陽也水一斗五升煮令得五升

汁服日三千金方

又方末滑石屑水服一二合

錄驗方治熱淋方

蘆心切三升水五升煮取二升三服

千金方治熱淋方

常煮冬葵根作飲服之

又方冬葵與氣淋同之

又方葵根一升冬用子大棗二七枚去核

二味水三升煮取一升二合分二服熱加黃芩

一兩出難加滑石二兩

常煮冬葵根作飲服之

又方冬葵^{アヒメ}根与氣淋同之

又方葵根一^{アヒメ}斗冬用子^{ヨア}

大棗二七枚去核

二味水三斗煮取一斗二合分二服^{オホホメ}熱加黃芩^{セハコヒコ}

一斗出難加滑石二兩

龍門方療熱淋方

服冷水三斗行一里即下^セ差

又方葵^{アヒメ}兩足外踝中央隨手^{ツマミ}出有石下

廣濟方療熱淋小便澀痛方

車前草^{アヒメ}切一斗通草三兩葵根^{アヒメ}切一斗

芒消六分^{成湯}切以水七斗煮取二斗去滓^{セキカ}內芒

消^{セキ}久溫三服忌熱食

治寒淋方第士

病源論云寒淋者其病先寒戰然後尿是也由腎

氣虛弱下焦受於冷氣入肥與心氣^{補之又腹内也}交爭寒氣

則戰寒而成淋心氣勝戰寒解故得小便也

新錄方治寒淋少腹下冷平足^{ヒエ}冷方

葵子一^{アヒメ}斗麴^{カク}末一斗水六斗煮取三斗半三服

又方葵子一斗小麦一斗六斗煮取三斗三服

治大小便不通方第十二

病源論云開格大小便不通也大便秘不通謂之內關

小便不通謂之外格二便俱不通為閉格也由陰

葵子一升 麴米一升 水六升 煮取三升 半三服

又方葵子一升 小麦一升 水六升 煮取三升 三服

治大小便不通方第十三

病源論云開格大小便不通也大便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱不通為閉格也由陰陽不和榮衛不通也

千金方治開格大小便不通芒消湯方

芒消五兩 一名石脾 大黃八兩 一名石脾 夕藥四兩 一名石脾

杏仁四兩 麻子人三兩 烏桕樹根皮五兩

凡六味以水七升 煮取三升 分三服

又方葵子一升 下三升 分三服

又方葵子橫文百枚

又方甄帶煮取汁和蒲黃方寸匕 日三服

又方葵子一升 榆皮切一升 水五升 煮取二升 分三服

三服

葛氏方治卒開格大小便不通文滿欲死二三日則斂人方

取塩以苦酒和塗脊中干復易之

又方自取手十指爪燒末以酒漿服

又方葵子二升 水四升 煮取一升 頓服之內猪

膏如鷄子一丸 三佳

集驗方治久不得大小便方

取塩以苦酒和塗脊中干復易之

又方自取手十指爪燒末以酒漿服

又方葵子二升水四升煮取一升頓服之內猪

膏如鷄子一丸二佳

集驗方治久不得大小便方

猪脂如鷄子著一杯酒中煮之令沸頓服

又方葵根汁服亦佳

范汪方治大小便不出方

豆醬內下部中令人吹則通小便以塩內

莖中則利良

經心方滑石散治大小便不通方

滑石二兩 榆皮一兩 葵子一兩

凡三物作散煮麻子一升半取一升八兩匕和

服不過二大升小便通

廣利方理氣權開格不通小便淋結者下方悶氣

兼痛方

冬葵子二大合 生茅根一握以水一大升

半煎取六升合去滓分溫二服

又玄關障不通肥脹妨悶大小便不通方

冬葵子三大合 綿裹 滑石十二分 碎

礎消十分 切以水二大升煎取

八大合去滓空服分溫再服別如人行四

半煎取六丈合去滓分溫二服

又云開胃不通肥脹妨瀉大小便不通方

冬葵子三丈合綿裹滑石十二分碎

礎消十分湯成切以水二大升煎取

八大合去滓空腹分溫再服別如人行四

五里忌肉麵

治大便不通方第十三

病源論云大便不通者猶三焦五藏不和冷熱之氣

不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕不結擁

塞不通也

葛氏方治大便不通方

研麻子以米雜為粥食之亦可直煮麻為

飲服之

又方剝烏梅皮以漬將豆中導下部

范汪方治大便不通方

用豆將腎內下部中則通

又方將胃中液切令如指長三寸內大孔中

秦養祖方不得大便數日方

作熱湯著甕中人居其中湯未冷則寒

又方灸下部後五分壯若大良

千金方治大便不通方

桑根一杞去赤皮 榆根一杞去赤皮

秦養祖方不得大便數日方

作熱湯著甕中人居其中湯未冷則寒

又方冬下部後五升此壯者大良

千金方治大便不通方

桑根一杞去赤皮 榆根一杞去赤皮

水三升煮取一升半分二服

又方恒煮麻子取汁飲之

龍門方療大便不通方

取膠廣二寸長四寸葱白一握以水三升和煮消

盡去滓一服驗

又方葵子半升搗末以水一升煮服之

醫門方療下部閉塞大行不出方

取烏梅廿枚柏砵湯中浸少時去核搗之如渾

丸大一枚內下部中立通

小品方大便閉塞氣結心滿方

灸石閉百壯 今案明堂在幽門下二寸

又方灸足大都隨年壯

經心方夕藥湯治脹滿大行不通方

夕藥六分 芒消六分 黃芩五分

大黃八分 杏仁八分

凡五味丸如梧子飲服十五丸日三

華他方云有病日食二斗米至二百日不大便亦元

經心方夕藥湯治脹滿大行不通方

夕藥六分

芒消六分

黃芩五分

大黃八分

杏仁八分

凡五味丸如梧子飲服十五丸日三

華他方云有病日食二斗米至二百日不大便亦元

所病苦何以尔名為何等病也此為穀瘦也穀

氣液牛道中去雖无病下閉不通不可長久治

之方

葛根五斤

猪肪三斤

凡二物葛根細剉洗之以水三斗煮之得

一斗半去滓復煎其汁得七升已取猪肪

肪切莖之成膏著葛根汁中煮使相得四

升所服二升二日盡之下開通營衛澤藥

無所禁服此藥開六府當下

治大便難方第十四

病源論云大便難者由五藏不調陰陽偏有虛

實三焦不和則冷熱并結故也

又云渴利之家大便之難為津液枯竭致令腸

胃乾燥

葛氏方云脾胃不和常患大便堅強難者

大黃三兩

夕藥三兩

厚朴三兩

枳實六斤

麻子人五合

又云渴利之家大便之難為津液枯竭致令腸胃乾燥カキカキ

葛氏方云脾胃不和常患大便堅強難者カキ

大黃三兩オホシ 夕藥三兩エヒレクリ 厚朴三兩ホコハノキ

枳實六斤カクダシ 麻子八五合マシ

鳩節蜜丸如梧子服十丸日三稍增以通セ

利為度可恒將之セキナリ

千金方治大便難方

單用豉清將胃清羊脂去依根汁並單灌ヒトヘ

之立出又方將胃清漬為梅灌下部中セキ

又方麻油二升內葱白三寸煮令黑去滓待キナネ

冷頓服又方炙萊菔三枚ヒヤカシム

又方夾玉泉相去各二寸炙之セヨ

新錄方大便乾骨立者方セヨ

灸胃管穴千主セヨ

又方生地黄切三升キナヒ 華切三升コミナ 以水一斗煮ヒシ

取二升五合分三服相去十里ハカリ

又方車眼馬莧汁一升ヨ 煮心ムナヒシ

又方鴉蒜為泥ヒレ 酒服如棗日三モチヨ

又方燒魚為灰ヒレ 酒服方寸匕日二三ナメ

又方服飢帶汁五六合日二コシホラ

承祖方治大便牢難腹堅連日欲死方カタナリ

又方車眼馬莧汁一升差心

又方鴉蒜為泥酒服如來日三

又方燒魚為灰酒服方寸匕日二三

又方服翫帶汁五六合日二

承祖方治大便牢難腹堅連日欲死方

甘遂光花黃芩 凡三物各等鴉丸如小豆

服五丸不通更服三丸

華他方治大便堅數清不能得出方

皂莢末下篩以猪脂和合葦管長一寸以指排

內穀道中者指一節須臾則去

又云二車丸主臨飯腹痛不能食復又大便難方

大黃十三兩 紫胡四兩 細辛二兩

茯苓一升 半夏一兩

凡五物治諸丸以蜜飲服如梧子五丸日再

集驗方治大便牢難腹堅連日欲死方

白蜜三升於微火上煎之使如強鋪以投冷水

中須臾當凝出丸如手指大長六寸七寸內

穀道中即得通

又云不得大便十日或一月煩滿欲死方

葵子二升水以四升煮取一升去滓頓服之

治大便失禁方第十五

病源論云大便失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛

穀道中即得通

又云不得大便十日或一月煩滿欲死方

葵子二升水以四升煮取一升去滓頓服之

治大便失禁方第十五

病源論云大便失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛

門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能

能溫制故使大便失禁之

千金方治老人小兒大便失禁

灸大指竒間各三壯兩腳

又方灸兩腳大指甲一寸三壯

治大便下血方第十六

病源論云此由五藏傷損所為藏氣既傷則風邪

易入熱氣在內亦大便下血其前便後下血者

血來遠也前下血後便者血來近也遠近者言

病在上焦下焦也

小品方云諸下血者先見血後見便此為遠血宜服

黃土湯若先見便後見血此是近血宜服赤小豆

散赤小豆散方

赤小豆三升熬

當歸二兩

凡二物治瘰癧方

寸匕日三

今案令李方黃連二兩酒服

黃土湯方

竈中黃土半升綿裹

甘草三兩

散赤小豆散方

赤小豆三升熬

當歸二兩

凡二物治瘧眼方

寸匕日三

今案令李方黃連二兩酒服

黃土湯方

竈中黃土半升綿裹

甘草三兩

干薑二兩

黃芩三兩

阿膠三兩

干地黄五兩一方三兩

凡六物以水一斗煮取

取三升分三服

今案集驗方有芍藥艾葉黃芩干地黄治下血如刺猪

葛氏方治卒下血方

豉一升以水三升漬豉三沸去滓頃服汁一升

日三冬天每服輒溫

又方豉二升以酒六升合煮得三升服一升日三

又方煮香葉極令濃去滓服一升日三

又方亂髮如鷄子大燒末水服之不過三

又方三指撮塩燒向東服之

又方灸兩足大指迴毛中退年壯即愈

僧深方治卒下血補黃散方

甘草一分

干薑一分

蒲黃一分

凡三物下篩酒服方寸匕日三

又方治卒注下并下血一日一夜數十行方

炙膠中及膠下一寸各五十粒

今案葛氏方以錢掩膠上炙錢

下除五

甘草一分 干薑一分 蒲黃一分

凡三物下瘀血服方寸匕日三

又方治卒注下并下血一日一夜數十行方

炙廬中及廬下一寸各五十粒今案葛氏方以錢掩廬上炙錢

下除五

醫門方治卒下血或目契契物而發方

生薑根汁 生地黄汁 生藕根

汁各飲一升日二卷 又方小豆末和水服

方寸匕日二服立差

范汪方治下血方

干地黄五兩 膠三炙

凡二物治莖久三服葛氏方可之

又方干地黄下 莖以酒服方寸匕日三

又云治大便血諸血衄血方

烏賊魚骨五分 桑耳一分

凡二物治莖酒服方寸匕日三

千金方下血日夜七八十行方

黃連四兩 黃蘗四兩 二米淳酢五升煮

取一升半久再服

枕中方治人下血方

取鷄蘗紋取汁多少任意服之愈今案集驗方治

婦人漏下

黃連四兩

黃蘗四兩

二米淳酢五升煮

取一升半久再服

枕中方治人下血方

取鷄蘗紋取汁多少任意服之愈

今案集驗方治

生血下血并婦人漏下

新錄方治卒下血兼血痔方

艾子及皮一升以水三升煮取一升三合分二

服

又方桃奴樹上死桃子也取一升以水三升煮取一升

三合分二服

又方取敗胎茹二升以水三升煮取一升二分二服

又方荆菜切三升以酒五升煮取一升六合分二服

又方赤小豆三升以水五升煮取一升六合汁渴飲

汁飢取豆

又方以水三升煮葱白一升半取一升二合汁分

三服

又云食契物下血方

鳩生葛根取七八合汁飲之

又方鳩生地黃取汁飲七八合

又方鳩生藕取汁飲七八合

又方生薑荷根汁飲六七合

又方酒三升煮大棗廿一枚取汁分二三服

鴉生葛根取七八合汁飲之

又方鴉生地黃取汁飲七八合

又方鴉生藕取汁飲七八合

又方生蕞荷根汁飲六七合

又方酒三升煮大棗廿一枚取汁分二三服

又方一水服石榴皮末方寸匕日二

又方鴉薊無問大小猫屎羊等取汁飲之

並好若冬月無生者掘取根或乾者切

二升以水三升煮取一升分二服

治小便不通方第十七

病源論云小便不通者膀胱與腎俱有熱故也腎

主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於

小腹入肥者為小便腎與膀胱熱入於肥熱氣

大盛故結澁令小便不通

葛氏方治小便不通方

熬塩令熱內囊中以熨小腹上

又方以塩滿唇灸上三壯

又方未滑石水服方寸匕

又方以衣中白魚出內小孔中

千金方治小便不通方

水四升洗甌帶取汁煮葵子取二升半分

三服

又方葵子車子水五升煮取二升半三服

本草云小薊根
止血通氣注云
本薊是薊苗是
苗薊方藥不用
又有薊苗

生手澤
小薊
力有殊
相
生

又方未滑石水服方寸匕

又方以衣中白鱼出内小孔中

千金方治小便不通方

水四升洗甑コシキキ帶取汁煮葵子取二升半分

三服

又方葵子アサヒ車子オモハ水五升煮取二升半三服

又方鯉鱼コヒ鳔灰末酒服方寸匕日三

又方真頭石末水服方寸匕日三

鯉鱼首石

新録方治小便不通方

水漬石迷ヒラキ尉ツカヒニ少腹下出或燒石アサキ尉セ少腹

以出為度

又方車前子オモハ一升以水三升煮取一升二合并

服

小品方小便不通及閉格方

取生土茯苓根ヒシク搏取汁アサ以少水ヒシキ解之於筒中

吹内下部フキイロ即通秘方

又云治小便閉方

豉半升シキ水四升煮一沸去滓ヒシカ一服立愈エ通

醫門方療小便不通方

取乱髮ハヅリカ如拳火燒カ作灰末シノ酒服方寸匕立

愈

又云療小便不通小腹滿悶不急療致人方

葱白切キノ一合キル塩少許ハシ搏ハシ絞取汁ハシ灌三五

豉半升水四升煮一沸去滓一服立愈通

醫門方療小便不通方

取乱髮如拳火燒作灰米篩酒服方寸匕立愈

又云療小便不通小腹滿悶不急療教人方

葱白切一合塩少許搗絞取汁灌三五

豆粗許入水道中水便出極効

集驗方治淋小便不利陰痛石壽散方

石壽二兩瞿麥一兩滑石五兩

車前子三兩葵子二兩

凡五物下篩先食服方寸匕日三

令李方治淋肥滿不得小便滑石散方

滑石一兩通草半兩石壽一兩

凡三物治後酒脹方寸匕日三

范汪方治小便不通方

取陳葵子一升淳酒三升煮之脹盡

治小便難方第十八

病源論云小便難者此亦是腎與膀胱熱故

故也

錄驗方治小便難淋瀝方

通草二兩伏苓二兩亭歷子二兩

葵凡三物下篩以水脹方寸匕日三

新錄單方治小便不出腹滿氣急者方

病源論云小便難者此亦是腎與膀胱契故
故也

錄驗方治小便難淋瀝方

通草二兩

伏苓二兩

亭歷子二兩

凡三物下篩以水脹方寸匕日三

新錄單方治小便不出腹滿氣急者方

灸關元穴在臍下三寸依年壯

又方車前草切三升以水五升煮取二升

分二脹日一

又方翫帶一枚以水五升煮取一升六合并服

又方大麻子三升以水五升煮麻子腹破分服

又方煮滑石取汁飲之立下

又方葵子二升以水四升煮取一升六合分三服

又方第根切二升煮服依前煎去渴敵妙

醫門方療小便難方

以少塩内莖孔中即通

治小便數方第十九

病洎論云小便數者膀胱與腎俱虛而有客

契乘之故也

范汪方治小便一日一夜數十行方

昌蒲黃連二物分等治節酒脹方寸匕

又方石膏半斤咬咀以水一斗煮取五升

稍脹已上葛氏

病疸論云小便數者膀胱與腎俱虛而有客
熱乘之故也

范汪方治小便一日一夜數十行方

昌蒲黃連二物分等治肺酒脹方寸匕

又方石膏半斤咬咀以水一斗煮取五升

稍脹已上葛氏方同之

千金方治小便利復非淋方

榆白皮二斤水一斗煮取五升服三合日三

又方三年重鶴巢燒末服之

葛氏方治小便卒太數復非淋一日數十過令人

疲瘦方冬兩足下第二指本節第一理七壯

又方不中水猪膏如鷄子者一枚炙下取

肥汁盡服之不過三此二方并治遺溺也

又方鷄腸草一把熟搗酒一升漬一時絞去

滓久并服

醫門方療小便數日夜出無節度方

小豆苗葉搗絞取汁飲一二升立止極効

治小便不禁方第廿

病源論云小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主

主水其氣下通於陰腎虛下焦冷不能溫制其

水液故小便不禁

雜錄方治小便不禁方

栢樹白皮切二升以水三升煮取一升二合分

治小便不禁方第廿

病源論云小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主水液故小便不禁

雜錄方治小便不禁方

栢樹白皮切二升以水三升煮取一升二合分再服相去十里

又方故甌帶以水三升煮取一升二合分二服

又方露蜂房灰酒服方寸匕日二

又方石榴皮子灰酒服方寸匕

又方榆白皮切二升水四升煮取一升六合二服

令李方小便不禁數行方

當歸二兩

甘草五分

凡二物治下諸漏

服半錢上日三一月若夏月內伏苓陰腫痛口黃者

分等

槎要方療小便不禁或如血色方

麥門冬八兩

茯苓子二兩

甘草一兩

乾薑四兩

桂心二兩

干地黄八兩

續斷八分

石水一斗煮取二升半分三服

治小便黃赤白黑方第廿一

僧深方治膀胱急契小便黃赤滑石湯方

滑石八兩

子苓三兩

車前子一升

葵十一升

榆皮四兩

乾薑四兩

桂心二兩

干地黄八兩

續斷八分

石水一斗煮取二升半分三服

治小便黃赤白黑方第廿一

僧深方治膀胱急契小便黃赤滑石湯方

滑石八兩

子苓三兩

車前子一升

葵十一升

榆皮四兩

凡五物以水七升煮取三升分三服

龍門方療人小便白稠方

取蜂房燒作灰和水一服一匕

范汪方治小便神多而或白精從溺後出方

枯樓三分

滑石二分

石聿一分

三物為散麥粥服方寸匕日三

又云治小便白濁而多方

桑茸三分

甘草五分

二物為散以酢

漿服方寸匕日三

又云治虛羸沙便青黃白黑白如米汁方

白善六分

龍骨五分

牡蠣二分

小豆三兩

炙大蓰根二分

凡五物治後以酒服

一方寸匕日三

治小便血方第廿二

病源論云心主於血与小腸合若心家有熱結於小

腸故小便血也

養生方云人食甜醅勿食大酢變為尿血也

小豆三兩燬 去薇根二升 凡五物治以酒服

一方寸匕日三

治小便血方第廿二

病源論云心主於血与小腸合若心家有熱結於小

腸故小便血也

養生方云人食甜醕勿食大酢變為尿血也

新錄方治尿血方

車前草搗 绞取汁服五合旦空腹服之

又方棘刺二升水四升煮取二升分三服

范汪方治小便血方

焉芋根五升搗 取汁服一升

千金方治尿血方

豉二升酒四升煮取一升頓服

又方生大麻根十枚水五升煮取二升分三服

又方龍骨細末温酒服方寸匕

又方燬塩熱熨少腹并主淋大良

又方刮滑石屑水和塗少腹繞陰際佳

又方豉大敦穴隨年壯

又云治房損傷中尿血方

牡蠣 車前子 桂心 黃芩

四味下篩飲服方寸匕日三加至二匕

又云治虛勞尿血淋方

葵子一升水三升煮取一升半日三

又方參大敦穴隨年壯

又云治房損傷中尿血方

牡蠣

車前子

桂心

黃芩

藥金

四味下篩飲服方寸匕日三加至二匕

又云治虛勞尿血淋方

葵子一升水三升煮取一升半日三

葛氏方治小便血方

萊根一把切煮去滓數飲之

又方楊慈白取汁服一升

小品方治生地黄湯治小便血方

生地黄半斤

柏葉一把

黃芩二兩

膠二兩

甘草二兩

凡五物以水七升煮

取三升絞去滓內膠令得二升半分三服

傳清安衆方療小便出血方

地黄汁一升

薑汁一合

相和頓服未差再

服

治遺尿方第廿三

病源論云遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也

范汪方治人喜遺尿方

防己防風各三分葵子二分治未服方寸匕一方

防己三升

又方燔石牡蠣分等治合以黍粥服方寸匕日三

令李方治遺溺夕藥散方

病源論云遺尿者此由膀胱虛冷不能約水故也
永傳又救也一之也

范汪方治人喜遺尿方

防已ハナハナ防風ハナハナ各三升ハナハナ葵子二升アヲヒ治未服方寸匕一方

又方ホシ燔石シカキカヒ牡蠣シカキカヒ分等治合以黍粥服方寸匕日三

令李方治遺溺夕藥散方

白薇アヲヒ一兩アヲヒ夕藥アヲヒ一兩アヲヒ凡二物治合下篩酒

若水服方寸匕日三

龍門方治遺尿不禁方

取鷄巢中乳屬又鷄也薄燒灰服一錢上日三七日イニ又

今案本草拾遺云水進方寸匕日三セヨ主噦セヨ

錄驗方治遺尿龍骨散方

來茸タシエハナ三兩タシエハナ燔石ホシ二兩シカキカヒ牡蠣シカキカヒ二兩

龍骨タシエハナ三兩

凡四物合治下篩服方寸匕日三

千金方治遺尿小便澀方

木防已アヲヒ二兩アヲヒ葵子アヲヒ二兩アヲヒ防風ハナハナ三兩ハナハナ

三味水五升煮取二升半分三服散セヨ主眼佳セヨ

小品方治遺尿癸化

灸遺道セヨ在使玉泉五升セヨ隨年壯

又方セヨ灸陽陵泉陰陵泉隨年壯在膝下一寸

治尿淋方第廿四

病源論云人有於眠睡不覺尿出者是其稟質陰

小品方治遺尿灸

灸遺道在使玉泉五入隨手壯

又方灸陽陵泉陰陵泉隨手壯在膝下一寸

治尿淋方第廿

病源論云人有於眠睡不覺尿出者是其稟質陰

氣偏盛陽氣偏虛者則膀胱腎氣俱冷不能溫制

於水則小便偏多或不禁而遺失

新錄方治尿床方

大麻根皮切三升以水五升煮取一升八合去滓

分二服小兒減之

又方大豆葉三升水五升煮取二升分三服

醫心方卷第十二